

តារាងសម្លាប់មេរោគ

សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

រៀបចំទឹកថ្នាំសម្លាប់មេរោគដោយប្រើទឹកអូសាវែល ប្រភេទប្រើក្នុងត្រួសារ (កំហាប់ ៥,២៥%

	ថ្នាំសម្លាប់មេរោគ កម្រិតទាប 100 PPM*	ថ្នាំសម្លាប់មេរោគ កម្រិតមធ្យម 1000 PPM*	ថ្នាំសម្លាប់មេរោគ កម្រិតខ្ពស់ 5000 PPM*
ឧទាហរណ៍នៃផ្ទៃ និងឧបករណ៍ ដែលត្រូវសម្លាប់ មេរោគ	ក្រាសសិតសក់ ដងកាន់ និងឧបករណ៍សម្រាប់ដាង កាត់សក់ តុ កៅអី គ្រែ និងកន្លែងសម្ងួតក្រចក	អាងត្រាំជើង, កន្ត្រៃកាត់ក្រចក, កន្ត្រៃកាត់ ស្បែកជុំវិញក្រចក, ក្បាលម៉ាស៊ីនកិនក្រចកធ្វើពី លោហៈ (អាចប្រើឡើងវិញបាន), ឧបករណ៍ ចោះត្រចៀក, គម្របដាក់ទឹកថ្នាំសម្រាប់ប្រើតែ ម្តង, ដង្កៀប (សម្រាប់ដកសក់ ឬរោមចេញពី ស្បែក ឬសម្រាប់បិទរោមភ្នែកសិប្បនិម្មិត)	ឧបករណ៍ខាត់ជើង/ឈូស ឧបករណ៍ញេចមុន ដែលមានចុង ដាវរង្វង់ ក្បាលខាត់ស្បែកប្រភេទ Diamond Microdermabrasion និងប្រដាប់ចាប់ទាញរោមដែលដុះ ចូលក្នុងស្បែកចេញមកក្រៅ
របៀបធ្វើ	ទឹកថ្នាំអូសាវែល ២ មីលីលីត្រ (កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ) ជាមួយ ទឹក ១ លីត្រ (៤ ពែង)	ទឹកថ្នាំអូសាវែល ១០ មីលីលីត្រ (២ ស្លាបព្រាកាហ្វេ) ជាមួយទឹក ៥០០ មីលីលីត្រ (២ ពែង)	ទឹកថ្នាំអូសាវែល ១២៥ មីលីលីត្រ (កន្លះពែង) ជាមួយទឹក ១ លីត្រ (៤ ពែង)
រយៈពេលត្រាំ	១០ នាទី	១០ នាទី	១០ នាទី
វិធីសម្ងួត	សម្ងួតដោយខ្យល់	លាងជម្រះ និងសម្ងួតដោយខ្យល់	លាងជម្រះ និង សម្ងួតដោយខ្យល់

* កំហាប់គឺជាការប៉ាន់ស្មាន ដោយសារតែការសម្រួលរូបមន្តលាយ

កំណត់សម្គាល់បន្ថែម៖

- សម្អាតផ្ទៃ និងឧបករណ៍នានាដោយប្រើសារធាតុសម្អាត ទឹក និងដក់ មុនពេលធ្វើការសម្លាប់មេរោគ។
- កុំលាយសារធាតុលាងសម្អាតប្រភេទអូសាវែល ជាមួយផលិតផលសម្អាតផ្សេងទៀត។
- លាយទឹកថ្នាំអូសាវែលថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
- ដាក់ស្លាកសម្គាល់លើដបផលិតផលសម្លាប់មេរោគ និងផលិតផលសម្អាតទាំងអស់។
- ប្រើរបៀបបាញ់ជាខ្សែទឹកនៅលើដបបាញ់ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការស្រូបចូល។
- ជៀសវាងប្រើទឹកថ្នាំអូសាវែល ដែលមានពណ៌ ឬមានក្លិនក្រអូប។ សារធាតុបន្ថែមដែលមាននៅក្នុងទឹកថ្នាំទាំងនោះ អាចបន្សល់ទុកនូវសំណល់នៅលើផ្ទៃសម្ភារៈ បើមិនបានលាងសម្អាតចេញឱ្យបានស្អាតល្អ។
- ដោយសារសារធាតុអូសាវែលកាត់ខ្លាំងចំពោះលោហៈ វាអាចបំផ្លាញសារធាតុស្អិត ឬឧបករណ៍នានា ប្រសិនបើត្រូវទុកចោលយូរពេក។ សូមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អ្នកផលិតឧបករណ៍ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ រួមទាំងប្រភេទថ្នាំសម្លាប់មេរោគដែលគួរប្រើប្រាស់ផងដែរ។

ឯកសារយោង៖

Public Health Ontario, The Guide to Infection Prevention and Control in Personal Service Settings, 3rd edition.